

# 骨髄線維症・本態性血小板血症の患者さんへ

治験にご参加いただける方を募集しております

## 治験薬の作用機序：BET阻害薬

治験薬は、BETタンパク質ファミリーの阻害薬です。BETタンパク質は、がん細胞の増殖、生存、分化を促進する多くのがん関連遺伝子の転写に不可欠であるため、BETを阻害することはこれらの細胞を選択的に阻害する可能性があります。

※この治験薬は、国内未承認の薬剤です

### ❖ この治験にご参加いただける方

#### 骨髄線維症 〈治験薬の単剤治療〉

- ◆ JAK阻害剤（ルキソリチニブや開発中の薬剤を含む）の治療が難しく、長く病状が続いて日常生活の負担が大きい方、毒性コントロールにお困りの方

#### 骨髄線維症 〈ルキソリチニブと治験薬との併用治療〉

- ◆ ルキソリチニブの治療では効果が十分得られていない方、または
- ◆ ルキソリチニブの治療をこれから開始される方

※ 上記のいずれにも該当する方で、触診や画像検査で脾腫が認められる方

#### 本態性血小板血症 〈治験薬の単剤治療〉

- ◆ ハイドレアの治療を受けていても、病気が改善しない方、毒性コントロールにお困りの方



治験にご参加いただいている間、一部のお薬代や検査費用、交通費等の負担が軽くなる場合があります。

### 詳細な情報について

下記のアドレスまたは、右のQRコードよりホームページにアクセスの上、「詳細検索＞臨床研究実施計画番号」に「**jRCT2041220002**」を入力ください。

URL:jRCT (<https://jrct.mhlw.go.jp/>)



### お問い合わせ

インサイト・バイオサイエンス・ジャパン合同会社

メディカルインフォメーションセンター

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2

東京ミッドタウン日比谷12階

電話：0120-094-139（平日9:00-17:30）

メール：[jpmedinfo@incyte.com](mailto:jpmedinfo@incyte.com)

# 治験実施医療機関

## 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院

- ❖ 所在地：千葉県柏市柏の葉6-5-1
- ❖ 連絡先：前ページに記載のお問い合わせ先、  
または、04-7133-1111

## 藤田医科大学病院

- ❖ 所在地：愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98
- ❖ 連絡先：代表（0562-93-2111）

## 山梨大学医学部付属病院

- ❖ 所在地：山梨県中央市下河東1110
- ❖ 連絡先：治験センター（055-273-9325）

## くまもと森都総合病院

- ❖ 所在地：熊本県熊本市中央区大江3-2-65
- ❖ 連絡先：代表（096-364-6000）